Sécuriser le parcours de soins par la coopération des structures, des outils et des hommes

La conciliation des traitements médicamenteux

Dr Marie-Océane DUFFOURC
Pharmacien
Centre hospitalier de Lunéville
maoduffourc@ch-luneville.fr

Un terme, une définition pour une pratique établie qui nécessite de se structurer

Collège de la HAS - 2015

La conciliation des traitements médicamenteux est un **processus formalisé** qui prend en compte, lors d'une nouvelle prescription, tous les médicaments pris et à prendre par le patient. Elle associe le patient et repose sur le partage d'informations et sur une coordination pluri-professionnelle.

Elle prévient ou corrige les erreurs médicamenteuses en favorisant la transmission d'informations complètes et exactes des médicaments du patient entre professionnels de santé aux points de transition que sont l'admission, la sortie et les transferts.

Encore appelée "conciliation médicamenteuse", terme consacré par l'usage.

Un terme, une définition les 2 modes de conciliation à l'admission

La conciliation est dite **proactive** ↙

lorsque le bilan médicamenteux est établi **AVANT** rédaction de la 1ère ordonnance à l'admission - **méthode de prévention des EM**

La conciliation est dite **rétroactive**

lorsque le bilan médicamenteux est établi **APRÈS** rédaction de la 1ère ordonnance à l'admission - **méthode d'interception des EM**

EM : Erreur médicamenteuse

Un terme, une définition les 2 modes de conciliation à l'admission

La conciliation est dite **proactive**

lorsque le bilan médicamenteux est établi **AVANT** rédaction de la 1ère ordonnance à l'admission - **méthode de prévention des EM**

La conciliation est dite **rétroactive** ↙

lorsque le bilan médicamenteux est établi **APRÈS** rédaction de la 1ère ordonnance à l'admission - **méthode d'interception des EM**

EM : Erreur médicamenteuse

La conciliation est une action d'amélioration de la prise en charge médicamenteuse du patient

Les actions d'amélioration de la prise en charge médicamenteuse du patient
Dufay E et al La REMED 2.0 – SFPC 2015

Synthèse des données de l'expérimentation Med'Rec

Rapport d'expérimentation Med'Rec France – HAS 2015

La conciliation médicamenteuse, une méthode puissante d'interception des erreurs médicamenteuses

Année	Données des 8 établissements ¹							
	Patients			Erreurs médicamenteuses		Divergences non documentées intentionnelles		
	éligibles P ²	conçiliés p ³	% p/P	EM N ₁ ⁴	EM/patient N ₁ /p	DNDI N ₂ ⁵	DNDI/patient N ₂ /p	
2010	1548	268	17,3%	242	0,9	280	1,0	
2011	34 343	2 357	6,9%	1 624	0,7	3 758	1,6	
2012	35 610	4 933	13,9%	3 890	0,8	4 448	0,9	
2013	35 951	6 417	17,8%	5 370	0,8	4 996	0,8	
2014	40 652	8 888	21,9%	10 194	1,1	10 238	1,2	
TOTAL	148 104	22 863	15,4%	21 320	0,9	23 720	1,0	

¹ - 8 établissements: CHU de Bordeaux, CH de Compiègne Noyon, CH de Lunéville, Clinique Moutiers Rozeille, CHU de Nîmes, AP HP Bichat Paris, CH St Marcellin, HU de Strasbourg

- CHU de Grenoble : non intégré dans ce tableau

- CHU de Nîmes : que les données des patients conçiliés dans les 24heures et selon le SOP Med'Rec → résultats minorés

² P : Patients éligibles à la conciliation dans le SOP Med'Rec - Plus de 65 ans hospitalisés après passage aux urgences

³ p : Patients conçiliés selon les critères d'éligibilité du SOP Med'Rec

⁴ N₁ : Nombre d'EM

⁵ N₂ : Nombre de DNDI

La conciliation à l'admission nature des EM

Nature de l'erreur médicamenteuse N = 7 828 EM

Expérimentation Med'Rec
données 2010-2014 CH de Lunéville

La conciliation à l'admission impact clinique

Gravité de 1677 EM interceptées et corrigées N= 1670 patients

	Physicians				
	SEVERITY	Minor	Significant	Major	Total
Pharmacist	Minor	1160	16	3	1179
	Significant	64	315	6	385
	Major	15	11	87	113
	Total	1239	342	96	1677

5,2% des EM auraient pu engendrer un EIG
4,2% des patients auraient pu subir un EIG

mineure
69,1%
significative
18,8%
majeure
5,2%

Dufay E et al. European Journal of Hospital Pharmacy 2016

EM : erreur médicamenteuse
EIG : événement indésirable grave

Impact de la conciliation médicamenteuse données internationales

B JACK – Programme RED *ReEngineered hospital Discharge*

- janvier 2006 à octobre 2007 – 700 patients
- diminution de 30,5% du recours à l'hospitalisation à 30 jours de la sortie ($p < 0,01$)
- diminution des coûts directs de 412\$ (34%)
- Programme multimodal

S LEGRAIN – Intervention OMAGE *Optimisation of Medication in AGE*

- avril 2007 à octobre 2008 – 665 patients – âge moyen 86 ans
- diminution de 30,5% du recours à l'hospitalisation à 90 jours de la sortie ($p < 0,1$)
- diminution des coûts directs de 512€
- Programme multimodal

A PHATAK – Etude IPITCH *Impact of Pharmacist Involvement in the Transitional Care of High-Risk Patients*

- novembre 2012 à juin 2013 – 341 patients – âge moyen 55 ans
- diminution de 36% du recours à l'hospitalisation à 30 jours de la sortie ($p < 0,001$)
- Programme multimodal

E DUFAY – Programme Med'Rec *Medication Reconciliation des High 5s*

- mai 2010 à avril 2011 – 382 patients âge ≥ 65 ans
- diminution de 29,3% du recours à l'hospitalisation à 30 jours de la sortie (NS)
- Programme monomodal

Les 4 séquences de la conciliation

La conciliation médicamenteuse à l'admission en 4 séquences

1

Recueillir les informations

La recherche active d'informations sur les traitements du patient auprès du patient et de son entourage, auprès des professionnels de santé de soins primaires et ceux d'établissements de santé, par l'exploitation de systèmes documentaires et/ou de bases de données

La formalisation du bilan médicamenteux

le bilan exhaustif et complet des médicaments concerne les médicaments pris par le patient observant ou non, prescrits ou non par un médecin

Nécessité de croiser au minimum 3 sources d'informations pour une confiance dans le bilan

2

Synthétiser les informations

La comparaison du bilan médicamenteux avec la prescription hospitalière en cours pour repérer les divergences entre le bilan et l'ordonnance en cours pour qualifier la ligne de prescription du médicament

comme ligne arrêtée, suspendue, poursuivie, modifiée, substituée ou ajoutée pour signaler si cette information est documentée ou non documentée

3

Valider le bilan médicamenteux

La validation pharmaceutique de la fiche de conciliation des traitements pour assurer une qualité constante dans les informations communiquées au médecin

La caractérisation en intention des divergences non documentées observées

comme divergences intentionnelles et divergences non intentionnelles = erreurs médicamenteuses

4

Partager et exploiter le bilan médicamenteux

La rédaction d'un complément d'information ou d'une nouvelle prescription

pour poursuivre la prise en charge médicamenteuse sécurisée du patient en tant que de besoin

Il s'agit de l'acte médical de conciliation proprement dit

1

Le recueil des informations les sources à consulter

- Entretien avec le patient
- Consultation du Dossier Pharmaceutique
- Entretien avec la famille
- Entretien avec le pharmacien d'officine
- Entretien avec le médecin traitant
- Lettre du médecin traitant
- Lettre au médecin traitant
- Médicaments apportés par le patient
- Liste des médicaments du patient
- Ordonnances apportées par le patient
- Fiche de liaison de l'EHPAD
- Entretien avec le médecin spécialiste
- Entretien avec l'infirmière à domicile
- Dossier Médical Patient
- Logiciel d'aide à la prescription
- Base de données « Réseaux locaux »
- ...

1

Le recueil des informations les sources à consulter

Nombre de lignes de médicaments identifiées selon la source

J Bonhomme, Risques et qualité, 2013
A Dony, Congrès SNPHPU, 2014

1

Le recueil des informations les sources à consulter

Quelques règles pour effectuer l'enquête des médicaments

- Consulter le dossier patient si celui-ci est constitué
- Prioriser un contact avec l'EHPAD si le patient est résident
- Avoir un contact immédiat avec le patient
- Privilégier le pharmacien d'officine comme source d'information
- Consulter les autres sources selon les circonstances dont le Dossier Pharmaceutique
- Consulter au minimum 3 sources d'information
- Interrompre la recherche de la juste liste s'il y a consensus
- Consulter 5 sources d'information pour être certain de votre bilan

1

Le recueil des informations l'entretien avec le patient

Quelques règles pour mener l'entretien avec le patient

- Poser des questions ouvertes, simples et « vulgarisées »
- Demander l'organisation de la gestion des médicaments
- Objectiver l'observance du traitement → questionnaire Girerd par exemple
- Vérifier l'existence ou non d'allergies / d'intolérances

TEST D'ÉVALUATION DE L'OBSERVANCE

- Ce matin avez-vous oublié de prendre votre médicament ?
 Oui Non
- Depuis la dernière consultation avez-vous été en panne de médicament ?
 Oui Non
- Vous est-il arrivé de prendre votre traitement avec retard par rapport à l'heure habituelle ?
 Oui Non
- Vous est-il arrivé de ne pas prendre votre traitement parce que certains jours votre mémoire vous fait défaut ?
 Oui Non
- Vous est-il arrivé de ne pas prendre votre traitement parce que certains jours vous avez l'impression que votre traitement vous fait plus de mal que de bien ?
 Oui Non
- Pensez-vous que vous avez trop de comprimés à prendre ?
 Oui Non

INTERPRÉTATION DU TEST

Oui (0) : Bonne observance
Oui (1) ou 2) : Minime problème d'observance
Oui (3) : Mauvaise observance

Adapté de Girerd, Evaluation de l'observance du traitement et de l'observance par un questionnaire. Revue française de pharmacologie et de thérapeutique, 1988, 32(1), 20-24.

1

Le recueil des informations l'entretien avec le patient

Quelques règles pour mener l'entretien avec le patient

- Se servir du support de l'enquête pour ne pas oublier de questions

Centre Hospitalier de Lunéville - Service de pharmacie Novembre 2016

XXXXX Louise 12/02/1923 IPF : 0000052136 Cardiologie – CH 170 04.02.2019 à 09.02 36 rue d'Alsace 54300 LUNÉVILLE Tél : 03 83 XX XX XX	Personne à contacter : ☐ Femme 06 XX XX XX XX Médecin traitant : Dr DUPONT à Lunéville Pharmacien d'officine : Dr MULLER à Lunéville Infirmier à domicile : Non Carte vitale Dossier Pharmaceutique : ☐ oui ☐ non Médicament rétrocedable : ☐ oui ☐ non	Gestion des médicaments Approvisionnement/délivrance : ☐ Femme Stockage/Gestion patients : Préparation : Patient Avec pilulier ? : ☐ oui ☐ non Administration : Patient Allergies : ☐ oui ☐ non (Médicaments/injections/implants)	Phytothérapies : ☐ oui ☐ non Automédication : ☐ oui ☐ non (soins/soinés/soins/contrastes) Crèmes/pommades : ☐ oui ☐ non Collyres : ☐ oui ☐ non Injections : ☐ oui ☐ non Vaccins : ☐ oui ☐ non Patchs : ☐ oui ☐ non Inhalateur : ☐ oui ☐ non
---	---	---	---

- Insister sur les médicaments particuliers et/ou à fréquence particulière
 - Médicaments à risque ? Médicament hebdomadaire ? Mensuel ?
 - Patchs / Injections / Collyres / Crèmes / Pommades ?
 - Médicaments sans prescription médicale / Automédication ?
 - Phytothérapie / Compléments alimentaires / Vitamines ?
 - Antibiotiques récents ?

1

Le recueil des informations l'entretien avec les professionnels de santé

Quelques règles pour mener l'**entretien** avec les professionnels

- Bien avoir en tête les questions à poser avant d'appeler
- Cibler sur les problèmes que vous avez soulevés / les doutes
- Essayer d'apporter une plus-value à votre appel
 - Un défaut d'observance
 - Une automédication abusive
 - Un problème de communication
 - ...
- Et bien sûr... les formules de politesse...

2

La synthèse des informations formalisation du bilan médicamenteux

Quelques règles pour effectuer **son bilan médicamenteux**

- Préciser le nom du médicament, le dosage, la forme et la posologie
- Au moindre doute, consulter des sources complémentaires
- Ne jamais interpréter un bilan médicamenteux
- S'il n'y a pas de consensus :
 - Effectuer le bilan le plus probable (source/s la/les plus sûre/s)
 - Expliquer en commentaires les divergences repérées lors de l'enquête
 - Donner toute l'explication au médecin de votre cheminement et de vos conclusions, tout en précisant que vous n'êtes pas sûr du résultat
 - ...

2

La synthèse des informations la comparaison du bilan médicamenteux à l'ordonnance en cours

ligne de médicament conciliée

principe actif, dosage, forme galénique, posologie, voie d'administration

4

Le partage et l'exploitation du bilan médicamenteux la caractérisation des divergences selon leur intention

ligne de médicament divergente

principe actif, dosage, forme galénique, posologie, voie d'administration